

č. porostu	Výměra (m ²)	Popis porostu	Poz. parc.č.
P1	116	skalník Dammerův (<i>Cotonoaster dammeri</i>), místy ořechokřídlec (<i>Caryopteris</i>), zahradní třešalka H. x hidcoteense 'Hidcote'	162/809 162/545
P2	125	růže šípková (<i>Rosa canina</i>) - 40 %, slivoně (<i>Prunus</i>) - 20 %, svída krvavá (<i>Cornus sanguinea</i>) - 20 %, jabloň (<i>Malus</i>) - 10 %, slivoň (<i>Prunus</i>) - 15 %, ořešák královský (<i>Juglans regia</i>) - 5 %.	162/577
P3	870	skalník (<i>Cotonoaster</i>), zahradní třešalka H. x hidcoteense 'Hidcote', kdoulovec (<i>Chaenomeles</i>), zlatice (<i>Forsythia x intermedia</i>), borovice blatka (<i>Pinus uncinata</i>), borovice kleč (<i>Pinus mugo</i>), borovice lesní (<i>Pinus sylvestris</i>), smrk omorika (<i>Picea omorika</i>), buk lesní (<i>Fagus sylvatica</i>), maloplodá jabloň (<i>Malus</i>).	162/299
P4	53	skalník Dammerův (<i>Cotonoaster dammeri</i>)	166/1 167/3 165/3 162/614
P5	1030	břečťan popínavý (<i>Hedera helix</i>), skalník (<i>Cotonoaster dammeri</i>), kdoulovec nádherný (<i>Chaenomeles superba</i>), bobkovišeň lékařská (<i>Prunus laurocerasus</i>), mochnovec křovitý (<i>Dasiphora fruticosa</i>), zahradní třešalka H. x hidcoteense 'Hidcote', mikrobiota křížolistá (<i>Microbiota decussata</i>). Rakytník řešetákový (<i>Hippophae rhamnoides</i>): borovice kleč (<i>Pinus mugo</i>), borovice černá (<i>Pinus nigra Nana</i>), jedle ojíňená (<i>Abies concolor</i>) metasekvoje tisovcovitá (<i>Metasequoia glyptostroboides</i>), smrk omorika (<i>Picea omorika</i>), buk lesní (<i>Fagus sylvatica</i>), maloplodá jabloň (<i>Malus</i>).	162/614 162/682 162/237 165/4 164/3 162/25
P6	250	hloh (<i>Crataegus</i>) - 50 %, růže šípková (<i>Rosa canina</i>) - 40 %, líska obecná (<i>Corylus avellana</i>) - 20 %	162/614 165/3 167/8 162/237 165/4
P7	47	růže šípková (<i>Rosa canina</i>)	165/4
P8	340	bříza bělokorá (<i>Betula pendula</i>) lípa srdčitá (<i>Tilia cordata</i>) – 80 %, jeřáb ptačí (<i>Sorbus aucuparia</i>) - 10 %	165/4 163/1 162/240 164/3
P9	70	růže šípková (<i>Rosa canina</i>)	166/7

			166/2
P10	390	růže šípková (<i>Rosa canina</i>) dub letní (<i>Quercus robur</i>), ostružiník (<i>Rubus</i>).	165/3 165/4 166/3 166/4 166/2 162/30 162/240
P11	460	vrba jíva (<i>Salix caprea</i>) - 70 %, bříza bělokorá (<i>Betula pendula</i>) - 15 %, lípa srdčitá (<i>Tilia cordata</i>) - výška cca 5 m, jeřáb ptačí (<i>Sorbus aucuparia</i>), vrba křehká (<i>Salix fragilis</i>), hloh (<i>Crataegus</i>)	162/24 162/293 162/240
P12	150	růže šípková (<i>Rosa canina</i>) - 75 %, svída krvavá (<i>Cornus sanguinea</i>) - 10 %, líska obecná (<i>Corylus avellana</i>) - 10 %, myrobanán třešňový (<i>Prunus cerasifera</i>) - 5 %.	162/240
P13	135	lípa srdčitá (<i>Tilia cordata</i>) - 40 %, jeřáb ptačí (<i>Sorbus aucuparia</i>) - 15 %, bříza bělokorá (<i>Betula pendula</i>) - 35 %, růže šípková (<i>Rosa canina</i>) -15%	162/240
P14	16	skalník Dammerův (<i>Cotonoaster dammeri</i>).	162/298
P15	14	růže šípková (<i>Rosa canina</i>)	166/1
P16	25	růže šípková (<i>Rosa canina</i>)	166/1
P17	30	vrba jíva (<i>Salix caprea</i>)	162/24
P18	21	vrba jíva (<i>Salix caprea</i>)	162/24
P19	19	růže šípková (<i>Rosa canina</i>)	162/240